

MIS VACUNAS

Si eres paciente con EPOC recuerda que para evitar exacerbaciones es importante vacunarse, pregúntale a tu médico qué vacunas debes tener.

VACUNAS	INDICACIÓN EN ADULTOS ¹
INFLUENZA	CADA AÑO
NEUMOCOCO	CADA 5 AÑOS, HASTA LOS 65 AÑOS, A PARTIR DE ESTA EDAD APLICAR UNA ÚNICA DOSIS
DPTA (TOSFERINA ACELULAR)	REALIZAR UN REFUERZO CADA 10 AÑOS
COVID 19	APLICAR SEGÚN LO INDICADO EN CADA GRUPO DE EDAD. ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN HACIENDO CLIC AQUÍ 

VACUNA	DÓISIS	FECHA ÚLTIMA APLICACIÓN	FECHA PRÓXIMA APLICACIÓN



Recuerda siempre llevar a tus controles el carné de vacunación

Este es un material de concientización de enfermedad desarrollado por Glaxosmithkline Colombia S.A. Ante cualquier duda, siempre consulte a su médico. Los datos personales del paciente no serán conocidos en ningún momento por GSK, sino que permanecerán para manejo de la institución tratante GlaxoSmithKline Colombia S.A., Avenida Calle 116 No. 7 - 15, Interior 2, Oficina 401A, Bogotá D.C.

Referencia 1. Lineamiento para vacunación contra Neumococo Polisacárido. Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Programa Amplio de Inmunizaciones. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PA/Lineamiento-introduccion-vacuna-vip.pdf> Fecha de consulta: noviembre 2022